

## Übungen zur Algebraischen Geometrie

*Blatt 10, Abgabe am 19.06.2007*

### Aufgabe 37

a) Sei  $f: X \rightarrow Y$  ein Morphismus von integren Schemata, der dominant ist, d. h. dass  $f(X)$  dicht in  $Y$  ist. Zeige, dass  $f$  eine Inklusion  $K(Y) \rightarrow K(X)$  der Funktionenkörper induziert.

b) Sei  $X$  ein integrires Schema,  $x \in X$ . Zeige, dass der natürliche Morphismus  $\text{Spec } \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow X$  dominant ist, und dass wir  $\mathcal{O}_{X,x}$  auf natürliche Weise als Unterring von  $K(X)$  auffassen können. Ist nun  $U \subseteq X$  eine nichtleere, offene Teilmenge, so ist  $\eta \in U$  und wir erhalten eine Abbildung  $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow K(X)$ . Zeige, dass diese Abbildung injektiv ist, und dass gilt:

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_{X,x}.$$

### Aufgabe 38

Gib ein nicht noethersches Schema an, dessen topologischer Raum noethersch ist.

### Aufgabe 39

Es sei  $k$  ein algebraisch abgeschlossener Körper und  $\mathcal{G} = \text{Grass}_{2,4}(k)$ . Wir benutzen die Bezeichnungen von Aufgabe 33. Beschreibe die Abschlüsse  $\overline{O_i}$ ,  $i = 2, 1, 0$ , explizit durch Gleichungen, einerseits bezüglich der Überdeckung durch Karten (vgl. Aufgabe 21), andererseits bezüglich der Einbettung in  $\mathbb{P}^5(k)$  (vgl. Aufgabe 25).

### Aufgabe 40

a) Sei  $X$  ein Schema,  $x \in X$ . Sei ferner  $\mathfrak{m} \subseteq \mathcal{O}_{X,x}$  das maximale Ideal des lokalen Rings in  $x$ . Dann ist  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  ein  $\kappa(x)$ -Vektorraum, und wir bezeichnen mit  $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$  seinen Dualraum. Der Raum  $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$  heißt der *Zariski-Tangententialraum* von  $X$  in  $x$  und wird auch mit  $T_{X,x}$  bezeichnet.

Sei nun  $k$  ein Körper,  $X$  ein  $k$ -Schema und  $x \in X$  ein Punkt mit Restklassenkörper  $\kappa(x) = k$ . Sei  $Z := \text{Spec } k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ . Sei  $z \in Z$  der einzige Punkt von  $Z$ . Sei  $\varphi \in (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$ . Zeige, dass es einen eindeutig bestimmten  $k$ -Algebrenhomomorphismus  $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}^2 \rightarrow k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$  gibt, dessen Einschränkung auf  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  die Form  $m \mapsto \varepsilon\varphi(m)$  hat. Zeige, dass man so eine Bijektion

$$(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^* \rightarrow \{f \in \text{Hom}_{\text{Spec } k}(Z, X); f(z) = x\}$$

erhält.

b) Sei  $k$  ein algebraisch abgeschlossener Körper. Gib Beispiele von  $k$ -Schemata  $X, Y, Z$  an, so dass alle drei Schemata denselben zugrundeliegenden topologischen Raum wie  $\mathbb{A}_k^1$  haben, und so dass

- für alle abgeschlossenen Punkte von  $X$  gilt:  $\dim T_{X,x} = 1$ ,
- für alle bis auf einen abgeschlossenen Punkt von  $Y$  gilt:  $\dim T_{Y,y} = 1$ ,
- für alle abgeschlossenen Punkte von  $Z$  gilt:  $\dim T_{Z,z} > 1$ ,